


ВЗК и беременность – как поступить?

Хирургические аспекты

Варданян Армен Восканович



Актуальность

ЯК и БК возникает
у людей репродуктивного
возраста



Актуальность

При ВЗК высокая частота рождения недоношенных и с низким весом

Женщины с ВЗК имеют больше рисков осложненного течения, как во время беременности, так и при родоразрешении

Мультидисциплинарная команда


- Гастроэнтеролог
- Колопроктолог
- Акушер-гинеколог
- Неонатолог



Актуальность



European
Crohn's and Colitis
Organisation



Surgery for UC during pregnancy can lead to miscarriage during the first trimester and to preterm labour in the third trimester, but continued illness is considered to represent a greater risk for the fetus

Язвенный колит

НЕ останавливать лечение!

Прекращение терапии = ухудшение ситуации =
осложнения и операция

До 1980 года

- До 19% материнской смертности после операции
- До 35% смерть плода

Язвенный колит

Основная проблема?

СТРАХ!!!

Стертая клиническая картина:

- Объемная матка
- Естественная тахикардия
- Гемодилуция ➡️ анемия + гипоальбуминемия
- Высокое СОЭ

Язвенный колит

Известные индексы активности не работают

С-реактивный белок

Язвенный колит

НЕЛЬЗЯ

Диагностика

Рентгенологические исследования
Использование в/в контраста

Можно

Диагностика

УЗИ
МРТ
Эндоскопия (колоноскопия, сигмоскопия)

Язвенный колит


Сигмоскопия/колоноскопия

➤ 5% преждевременных родов

- Эксперт эндоскопист
- Легкая седация (мидазолам/пропофол)
- В положении на боку!



15 неделя



22 неделя

Язвенный колит

Операция

❖ Лапаротомия /лапароскопия

- Описано 56 случаев колэктомии
- 2 (3,5%) лапароскопическим способом
- В РФ – 1 случай лапароскопической колэктомии
- В НМИЦК – 4 случая




Язвенный колит

Операция

❖ Лапаротомия /лапароскопия

- Надежно ушить культю прямой кишки (double-stapling, дополнительное ушивание, укрывание сальником)
- Трансанальная декомпрессия
- Илеостома в правильном месте (справа)



Язвенный колит

Операция

❖ Колэктомия + Кесарево сечение

- Синхронное вмешательство рекомендуется после 28 недель
- Колэктомия в 3 триместре безопаснее, чем в начале беременности
- Отключающая двустольная илеостома ???

Am Surg. 2011

ClinObstet Gynecol. 2011


Dis Colon Rectum. 2003

Язвенный колит

Операция

❖ Лапароскопич

- Время операции
- Кровопотеря – 3
- Низкое предлежа
- П/о койко-день –



Язвенный колит

Операция - колэктомия

❖ ВСЕГО в НМИЦ Колопроктологии – 4 пациента

- У всех здоровые малыши (кесарево сечение в срок)
- У всех J - резервуар
- У всех закрыта стома
- Медиана наблюдения 3,4 года
- Все счастливы!!!

Болезнь Крона

Как поступить?

Не останавливать лечение

Контроль гнойного процесса

Дренирование под контролем УЗИ

J R Soc Med. 1997
Arch Surg. 2009
J Crohns Colitis. 2011



Болезнь Крона

Операция

❖ Резекция пораженного участка (илеоцекальный отдел)

- Илеостома
- Первичный анастомоз не рекомендуется
- Лапароскопические вмешательства - приоритет



Спасибо за
внимание!



coloproctology_centr



dr_armen_vardanyan

armvard@yandex.ru