



А вы знали?

... что был проведен новый метаанализ, суммирующий более 30 лет сбора опыта применения перорального препарата Пентаса® (месалазин с пролонгированным высвобождением) при язвенном колите (ЯК) легкой или средней степени тяжести?¹

Систематический обзор и метаанализ подтвердили стабильную эффективность и безопасность перорального препарата Пентаса при лечении ЯК и поддержании ремиссии¹

Всего, было проанализировано **3 674** пациентов, проходивших лечение Пентасой:¹
 - Индукционная терапия: 755 (5 исследований);
 поддерживающая терапия: 2 919 (7 исследований)

в сравнении с плацебо	Пентаса	в сравнении с другими 5-АСК*
Превосходит (ARD: 15%) [†]	Индукционная терапия	Схоже*
Превосходит (ARD: 18%) [§]	Поддерживающая терапия	Схоже по данным РКИ ¹ Превосходит по данным РКИ и клинической практики (ARD: 4%) [§]
Схоже*	Безопасность	Схоже: Месалазины ² Евдрагит-Л/С Превосходит сульфалазин (ARD: 7%) ^{**}

Превосходит: статистически значимо при $p < 0,05$; схоже: $p > 0,05$

Наличие различных форм Пентасы помогает врачам индивидуализировать лечение и оптимизировать дозировки для улучшения исходов¹

Инструкция по применению Пентасы представлена по адресу [\[вставить ссылку на местную инструкцию по применению\]](#)

ARD - абсолютное различие риска; РКИ – рандомизированные контролируемые исследования; ЯК – язвенный колит
 Включая месалазины Евдрагит-Л, Евдрагит-С и ММХ и сульфалазин

Пентаса 4 г/день

Пентаса 2,25-3 г/день в сравнении с месалазинами Евдрагит-С, Евдрагит-Л 2,4-3 г/день

Пентаса 2-4 г/день

Пентаса 1,5-2,25 г/день в сравнении с месалазином Евдрагит-С 1,2-2,4 г/день и сульфалазином 3 г/день

Пентаса 1,5-4 г/день в сравнении с месалазином Евдрагит-С 1,2-3,6 г/день и сульфалазином 3 г/день

Пентаса 1-4 г/день

Пентаса 1,5 г/день в сравнении с сульфалазином 3 г/день

1. Paridaens K et al. Curr Med Res Opin 2021; 1-10.