



Знаете ли вы?

... что ожирение может быть связано с повышенным риском развития болезни Крона (БК)?

В рамках сводного анализа 5 предполагаемых групп риска из 8 западных стран установлено, что ожирение* связано с повышенным риском развития БК, но не ЯК¹

Среди 601 009 участников исследования (возрастной диапазон: от 18 до 98 лет), на основании данных наблюдения в объеме 10 110 018 человеко-лет, каждые дополнительные 5 кг/м² ИМТ связаны с:¹

16 %

(сОР: 1,16 (ДИ: 95% 1,05, 1,12)

повышение риска развития
БК

0 %

(сОР: 1,00 (ДИ: 95% 0,90, 1,05))

повышение риска развития
ЯК

Распространение ожирения в общемировом масштабе увеличилось втрое с 1975 года, что может являться одним из важнейших факторов, способствующих повышению риска развития БК в различных странах^{1,2}

* Определено как ИМТ ≥30 кг/м²

сОР: скорректированный относительный риск; ИМТ: индекс массы тела; БК: болезнь Крона; ЯК: язвенный колит

1. Chan SSM et al. Журнал "Клиническая гастроэнтерология и гепатология", 2021; S1542-3565(21)00720-5.

2. ВОЗ. Ожирение и избыточный вес. 9 июня 2021 г.

RU-PA-2100045 | Ред. 1.0 | Сентябрь 2021 г.