



Знаете ли вы?

...что у пациентов, страдающих язвенным колитом (ЯК), были выявлены несколько независимых диагностических признаков колоректальных стриктур?

В ходе ретроспективного группового исследования пациентов, страдающих ЯК, было обнаружено, что постановка диагноза в возрасте >40 лет и прием стероидов повышают риск формирования стриктур, в то время как назначение месалазина снижает этот риск¹

80–90%
повышение риска в возрасте
>40 по сравнению с
возрастом ≤40 лет[†]

Возраст
постановки
диагноза^{*1}

310%
повышение риска у пациентов,
принимающих стероиды, по
сравнению с пациентами, не
принимающими стероидов[‡]

Прием
стериодов¹

Лечение
препаратором
месалазин¹

70%
снижение риска у пациентов,
принимающих месалазин, по
сравнению с пациентами, не
принимающими месалазин^{*}

Не выявлено значительной связи между развитием стриктур и следующими факторами: курение; наличие ВЭК в семейном анамнезе; удаление аппендицса; степень развития заболевания; предыдущий прием ингибиторов ФНО, иммунодепрессантов или ведолизумаба¹

N=439; средняя продолжительность наблюдения: 9,6 лет.

Врачи должны оценивать эти факторы и обращать на них внимания в рамках своей обычной практики для выбора наилучшего терапевтического подхода для профилактики развития колоректальных стриктур¹

^{**}Возраст постановки диагноза определен согласно Монреальской классификации: ≤16 лет (A1); 17–40 лет (A2); >40 лет (A3)

[†]ОР = 1 для A3 по сравнению с 0,2 для A2 и 0,1 для A1 ($p=0,008$)

[‡]ОР = 4,1 в случае приема стероидов по сравнению 1 у пациентов, не принимающих стероидов ($p=0,042$)

^{*}ОР = 0,3 для пациентов, принимающих месалазин, по сравнению с 1 у пациентов, не принимающих месалазин ($p=0,029$)

ОР: относительный риск; ФНО: фактор некроза опухоли; ЯК: язвенный колит.

1. Lauran PA et al. Журнал "Клиническая гастроэнтерология и гепатология" 2021;19:1899-1905.e1.