

Разработка и первичная психометрическая валидация критериев эффективности, сообщаемых пациентами со свищем прямой кишки Крона: шкала качества жизни при свище прямой кишки Крона (CAF-QoL)

Development and initial psychometric validation of a patient-reported outcome measure for Crohn's perianal fistula: the Crohn's Anal Fistula Quality of Life (CAF-QoL) scale

Сэмюэль О. Адегбола^{1,2}, Лесли Диббли³, Капил Сахнан^{1,2}, Тиффани Уэйд⁴, Азмина Верхе⁵, Рашель Сойер⁵, Самю Манник⁵, Дэмиан МакКласки⁵, Пол Бассетт², Нуха Яссин², Яниндра Варусавитарне^{1,2}, Омар Фаиз^{1,2}, Робин Филлипс^{1,2}, Фил Дж. Тозер^{1,2}, Кристин Нортон⁴, Алиса Л. Нарт^{1,2}

АННОТАЦИЯ

Введение. Свищи прямой кишки Крона представляют проблему для пациентов и врачей. Многие не демонстрируют ответ на доступное лечение и, несмотря на рекомендации глобального консенсуса, в настоящее время не существует специфических инструментов для определения качества жизни конкретного пациента для измерения ответа на лечение. Мы представляем новый валидированный метод измерения результата на основании отчетов пациентов (PROM) для данного сложного фенотипа заболевания.

Методы. Проект опросника был разработан с помощью неструктурированного качественного опроса пациентов о качестве жизни со свищами прямой кишки Крона, рекомендаций международного междисциплинарного консенсуса, систематического обзора результатов оценки терапевтического/хирургического/комбинированного лечения и дня участия пациента и общества. Были оценены психометрические свойства, в том числе конструктивная валидность (путем сравнения со Шкалой тревожности и депрессии в больнице (HADS) и Опросником по воспалительным заболеваниям кишечника Великобритании (UK-IBDQ)), а также надежность и уровень ответа путем анализа повторения тестов.

Результаты. Данные 211 пациентов привели к разработке окончательного опросника из 28 вопросов. Раздел качества жизни со свищами прямой кишки Крона (CAF-QoL) продемонстрировал внутреннее соответствие (коэффициент надежности Кронбаха 0,88), отличную стабильность (внутригрупповая корреляция 0,98) и хороший ответ и конструктивную валидность с положительной корреляцией с UK-IBDQ и HADS. Заключение. Шкала CAF-QoL готова для использования в качестве PROM в исследованиях и клинической практике. Она дополняет объективную клиническую оценку свищей путем определения влияния на пациента.

Источник <https://gut.bmj.com/content/70/9/1649>