

23.06.2022, 18:34

АССОЦИАЦИЯ ЦЕЛИАКИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА:
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕЕСТРА

ССЫЛКИ НА ПОЛНЫЙ ТЕКСТ



Am J Gastroenterol. 25 мая 2022, doi: 10.14309/ajg.0000000000001834. Онлайн до печати.

**АССОЦИАЦИЯ ЦЕЛИАКИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА:
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕЕСТРА**

[Карл Марильд](#)^{1,2}, [Йонас Содерлинг](#)^{3,4}, [Бенджамин Лебволь](#)⁵, [Петер Хр Грин](#)⁵,

[Мария Инес Пинто-Санчес](#)⁶, [Йонас Халфварсон](#)⁷, [Бьорн Роелстрате](#)³, [Ола Олен](#)^{4,8,9},

[Йонас Ф Людвигссон](#)^{3,5,10}

Членство

PMID: 35613563 DOI: [10.14309/ajg.0000000000001834](https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001834)

Аннотация

Задачи: Определить риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у пациентов с целиакией (и наоборот) по сравнению с аналогичными показателями в общей популяции.

Методы: На основании данных гистопатологии и реестра здравоохранения Швеции мы выявили 48 551 пациент с целиакией и 83 529 пациентов с диагнозом ВЗК за период 1969-2016 гг. Все пациенты сравнивались с сопоставимыми по возрасту и полу пациентами из общей популяции (целиакия: n=240 136; ВЗК: n=408 195). Регрессия Кокса определила отношение рисков (ОР) для ВЗК у пациентов с целиакией и наоборот. Для уменьшения возможной погрешности наблюдения наши основные аналитические исследования ограничивались случаями по истечении первого года наблюдения.

Результаты: За время наблюдения ВЗК было диагностировано у 784 (1,6%) пациентов с целиакией по сравнению с 1015 (0,4%) пациентами из группы сравнения. У пациентов с целиакией ОР для ВЗК составил 3,91 (95% ДИ 3,56-4,31), при этом ОР для болезни Крона (4,36; 3,72-5,11) и язвенного колита (3,40; 3,00-3,85) в целом схожи. За время наблюдения целиакия была диагностирована у 644 (0,8%) пациентов с ВЗК и 597 (0,1%) пациентов группы сравнения. ОР для целиакии у пациентов с ВЗК составило 5,49 (95% ДИ 4,90-6,16), причем самые высокие оценки риска наблюдались при язвенном колите (ОР=6,99; 6,07-8,05), ОР для болезни Крона оказалось 3,31 (2,69-4,06). У пациентов с целиакией и ВЗК интервал диагностических проверок, как правило, был меньше 1 года, однако ОР равные 3-4 встречались даже после 10 лет наблюдения. За 20 лет наблюдения у 2,5% пациентов с целиакией возникло инцидентное ВЗК, а у 1,3% пациентов с ВЗК развилась целиакия.

Выводы: Двухнаправленная связь между диагнозом целиакия и воспалительным заболеванием кишечника требует внимания при первоначальной оценке и последующем наблюдении за этими заболеваниями. Их совместное появление, независимо от временной последовательности, предполагает общую этиологию.

Опубликовано © 2022 Американской коллегией гастроэнтерологии.

Сопутствующая информация

[MedGen](#)

LinkOut - другие ресурсы

Полные источники текста [Ovid Technologies, Inc.](#)

[Wolters Kluwer](#)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35613563/>