



Знали ли вы?

...что раннее развитие язвенного колита (ЯК) связано с повышенным риском возникновения колоректального рака (КРР), а более длительный прием 5-АСК снижает этот риск?

В корейском общенациональном популяционном исследовании риск возникновения КРР был в целом ниже для пациентов с ЯК по сравнению с общей популяцией, но увеличивался при раннем развитии ЯК (возраст <40 лет)¹

Возраст	Риск для пациентов с ЯК по сравнению с общей популяцией, ОР	
≤ 19 лет	14.37	всего 0,74
20-39 лет	2.74	
40-59 лет	0.58	
≥ 60 лет	0.70	

Также было обнаружено, что более длительный прием 5-АСК снижает риск КРР:	Квартиль применения	Скорректированное ОР:
	1-й	1
	2-й	0.40
	3-й	0.48
	4-й	0.30

30 546 пациентов с ЯК (диагноз поставлен в 2006-2015 гг.) и 88 829 лиц того же возраста и пола без ЯК; средний период наблюдения 5,2 и 5,3 года соответственно

Эти данные подчеркивают важность контрольной колоноскопии, особенно у пациентов молодого возраста с диагнозом ЯК, и подтверждают роль месалазина в химиопрофилактике¹⁻³

5-АСК: 5-аминосалициловая кислота; КРР: колоректальный рак; ОР: отношение рисков; ЯК: язвенный колит

1. Hee MK et al. J Gastroenterol 2021;10:1-7.

2. Lyakhovich A et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:202-9.

3. O'Connor A et al. Inflamm Bowel Dis 2015;21:2562-9.